



대장내시경시 주의사항

복용약 관련	<p>▶ 심장질환이나 뇌질환, 신장질환, 천식, 만성폐질환, 고혈압, 협심증, 당뇨등으로 현재 복용중인 약물 치료나 인슐린 주사를 맞고 계신분은 사전에 상담바랍니다.</p> <p>▶ 현재복용중인 처방약물 중 항응고제 (와파린, 헤파린)나 항혈전제 (아스피린, 플라빅스 등) 관련 약물 용하시는 경우, 필요시 반드시 주치의 상담후 중단여부를 확인 바랍니다. (심장질환/뇌질환으로 복용중인 약 제외 아스피린은 7일 정도 중단)</p> <p>▶ 검사 당일 오전6시 고혈압약은 소량의 물과 함께 드세요. 그 외에 약들은 전날까지만 복용 하세요.</p>
음식섭취 관련	<p style="text-align: center;">3~4일 전부터 피해야 하는 음식</p> <p>현미밥, 잡곡밥, 검은쌀, 깨, 김치류, 쌈채소류, 콩나물, 우거지, 고사리, 도라지, 미역, 미나리, 육류, 씨가 있는 과일, 견과류 등</p> <p style="text-align: center;">드릴수 있는 음식</p> <p>흰쌀밥, 생선, 목, 달걀,두부류, 감자, 카스테라, 이온음료, 사과, 배, 바나나등</p> <p style="text-align: center;">검사 전날 식사</p> <p>오전검사자는 오후 2시 , 오후검사자는 오후 5시에 흰죽으로 마지막 식사 하세요. (반찬없이 드시고 식사 이후는 물만 드실수 있습니다.)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="336 1081 826 1653" style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f96; color: white; padding: 2px;">피할 음식</p> <p>잡곡밥, 검은쌀, 현미밥, 깨죽 등...</p>  <p>김치류, 나물류, 해조류(미역, 김, 다시마), 콩나물</p>  <p>씨가 있는 과일(수박, 참외, 딸기, 포도, 키위 등), 고추씨, 옥수수, 견과류(땅콩, 잣, 호두)</p>  </div> <div data-bbox="847 1081 1337 1653" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #90ee90; color: white; padding: 2px;">드릴 수 있는 음식</p> <p>흰쌀밥, 흰죽만 가능</p>  <p>두부류, 목, 국물류, 빵종류, 맑은 음료류 (맑은 주스, 녹차, 이온음료 등)</p>  <p>사과, 배, 바나나, 감자</p>  </div> </div>
기타	<p>▶ 짙은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.</p> <p>▶ 목걸이, 반지, 피어싱등 모든 액세서리는 착용하지 마세요.</p> <p>▶ 손, 발톱 젤네일 , 매니큐어는 지우고 오시기 바랍니다.</p> <p>▶ 수면내시경 대상자는 검사 후 <u>당일운전은 불가</u>하오니 반드시 대중교통을 이용바랍니다.</p> <p>▶ 검사 후 용종 제거시 <u>비행기 탑승이 일주일간 불가능</u> 하시니 참고 부탁드립니다. (용종 제거시 1~2일정도 입원이 필요 할 수 있습니다.)</p>

오라팜(28정) 복용법 (오전 검사)



- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토 등 증상 발생시 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

		오후 6시~6시30분	오후 6시30분~
1차 복용 (검사전날) 오후 6시	 		
	① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)	② 알약 복용후 물 1L이상 천천히 복용해주세요.	
		오전 5시~5시30분	오전 5시30분~
2차 복용 (검사당일) 오전 5시	 		
	① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)	② 알약 복용후 가소콜 2포 를 짜서 모두 드세요. ③ 병원 내원하시기 전까지 물 1L이상 대변 찌꺼기 안나올 때까지 천천히 복용하세요.	

오라팜(28정) 복용법 (오후 검사)

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토 등 증상 발생시 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

		오후 10~10시30분	오후 10시30분~

1차 복용 (검사전날) 오후 10시	 	
	<p>① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)</p>	<p>② 알약 복용후 물 2L이상 천천히 복용해주세요.</p>
2차 복용 (검사당일) 오전 10시	오전 10시~10시30분	오전 10시30분~
	 	
	<p>① 1회 1~2정씩 천천히 14알을 복용해주세요. (편하신대로 알약을 나눠 복용하시면 됩니다)</p>	<p>② 알약 복용후 가소콜 2포를 짜서 모두 드세요.</p> <p>③ 병원 내원하시기 전까지 물 1L이상 대변 찌꺼기 안나올 때까지 천천히 복용하세요.</p>
<p>민병원 대표번호 : 02) 982-3114 , 검진센터 : 02) 982-3399</p> 		

원프렙 복용법

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토증상이 발생시는 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

원프렙 복용 시간	검사시작 4~5시간 전에 복용 합니다.		
1차복용			
	① A제(1포)와 B제(1포)를 컵에 붓고 찬물 230ml를 표시선까지 채운후 녹을때 까지 섞어주세요.	② 조제용액 230ml를 10분에 걸쳐 천천히 복용합니다.	③ 물 2컵 (460ml)를 20분간 나누어 천천히 마십니다. ④ 가소콜 1포 를 짜서 드세요.
2차복용			
	① A제(1포)와 B제(1포)를 컵에 붓고 찬물 230ml를 표시선까지 채운후 녹을때 까지 섞어주세요.	② 조제용액 230ml를 10분에 걸쳐 천천히 복용합니다.	③ 물 2컵 (460ml)를 20분간 나누어 천천히 마십니다.

민병원 대표번호 : 02) 982-3114 , 검진센터 : 02) 982-3399



수클리어산 복용법 (오전 검사)

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토증상이 발생시는 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

오후 6시~ 6시 30분

1차 복용
(검사전날)
오후 6시
복용



- ① 수클리어 한 포를 병에 넣고 물을 가득 채우신 후 흔들어주세요.
- ② 주무시기 전까지 물(생수) 2병 이상 천천히 많이 드세요.
(물은 기재된 양보다 더 많이 드시기 바랍니다.)
- ② 조제한 약을 천천히 나누어 복용하세요.

오전 5시~ 5시 30분

2차 복용
(검사당일)
오전 5시
복용



- ① 수클리어 한 포를 병에 넣고 물을 가득 채우신 후 흔들어주세요.
- ② 조제한 약을 천천히 나누어 복용하세요.
- ③ 가스콜(기포제거제) 4포를 짜서 모두 드세요.
- ⑤ 병원 내원하시기 전까지 물(생수) 2병 이상 천천히 많이 드세요.
(물은 기재된 양보다 더 많이 드시기 바랍니다.)

수클리어산 복용법 (오후 검사)

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토증상이 발생시는 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

검사당일
오전 6시
복용



- ① 수클리어 한 포를 병에 넣고 물을 가득 채우신 후 흔들어주세요.
- ② 조제한 약을 천천히 나누어 복용하세요.
- ③ : ①②를 반복하여 한번 더 조제하신 후 천천히 복용 합니다.
- ④ 가스콜 4포를 짜서 모두 드세요.
- ⑤ 병원 내원하시기 전까지 물(생수) 3병 이상 천천히 많이 드세요.
(물은 기재된 양보다 더 많이 드시기 바랍니다.)

민병원 대표번호 : 02) 982-3114 , 검진센터 : 02) 982-3399

