



원프렙 복용법

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토증상이 발생시는 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

원프렙 복용 시간	검사시작 4~5시간 전에 복용 합니다.		
1차복용			
	① A제(1포)와 B제(1포)를 컵에 붓고 찬물 230ml를 표시선까지 채운후 녹을때 까지 섞어주세요.	② 조제용액 230ml를 10분에 걸쳐 천천히 복용합니다.	③ 물 2컵 (460ml)를 20분간 나누어 천천히 마십니다. ④ 가소콜 1포 를 짜서 드세요.
2차복용			
	① A제(1포)와 B제(1포)를 컵에 붓고 찬물 230ml를 표시선까지 채운후 녹을때 까지 섞어주세요.	② 조제용액 230ml를 10분에 걸쳐 천천히 복용합니다.	③ 물 2컵 (460ml)를 20분간 나누어 천천히 마십니다.

민병원 대표번호 : 02) 982-3114 , 검진센터 : 02) 982-3399

