

수클리어산 복용법 (오전 검사)

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토증상이 발생시는 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

오후 6시~ 6시 30분

1차 복용
(검사전날)
오후 6시
복용



- ① 수클리어 한 포를 병에 넣고 물을 가득 채우신 후 흔들어주세요.
- ② 주무시기 전까지 물(생수) 2병 이상 천천히 많이 드세요.
(물은 기재된 양보다 더 많이 드시기 바랍니다.)
- ② 조제한 약을 천천히 나누어 복용하세요.

오전 5시~ 5시 30분

2차 복용
(검사당일)
오전 5시
복용



- ① 수클리어 한 포를 병에 넣고 물을 가득 채우신 후 흔들어주세요.
- ② 조제한 약을 천천히 나누어 복용하세요.
- ③ 가스콜(기포제거제) 4포를 짜서 모두 드세요.
- ⑤ 병원 내원하시기 전까지 물(생수) 2병 이상 천천히 많이 드세요.
(물은 기재된 양보다 더 많이 드시기 바랍니다.)

수클리어산 복용법 (오후 검사)

- ▶ 잦은 대변 배출로 탈수증상이 생길 수 있으니 생수 및 이온음료를 4병 이상 천천히 드세요.
- ▶ 약 복용중 **두통, 메스꺼움, 구토증상이 발생시는 복용을 잠시 중단 후 다시 천천히 복용하세요.**
- ▶ **수면내시경** 대상자는 검사 후 **당일운전은 불가**하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

검사당일
오전 6시
복용



- ① 수클리어 한 포를 병에 넣고 물을 가득 채우신 후 흔들어주세요.
- ② 조제한 약을 천천히 나누어 복용하세요.
- ④ 가스콜 4포를 짜서 모두 드세요.
- ⑤ 병원 내원하시기 전까지 물(생수) 3병 이상 천천히 많이 드세요.
(물은 기재된 양보다 더 많이 드시기 바랍니다.)
- ③ : ①②를 반복하여 한번 더 조제하신 후 천천히 복용 합니다.

민병원 대표번호 : 02) 982-3114 , 검진센터 : 02) 982-3399

